

## GRANDES CULTURES

### COLZA

#### Morsures diverses

Des feuilles dévorées sont observées sur colzas, dans des proportions parfois importantes. Outre les limaces, très actives avec les conditions climatiques actuelles, nous avons mis en évidence la présence de tenthrèdes de la rave (*Athalia rosae*). Ces "mouches" jaunes et noires de 6 à 8 mm de long, habituellement peu fréquentes, sont piégées en grandes quantités dans les cuvettes depuis quelques jours. Seules les larves sont nuisibles : chenilles de couleur gris-noir qui dévorent les feuilles entre les nervures.

En cas de dégâts importants, une intervention est à réaliser, avec un insecticide efficace sur altise (mêmes produits, mêmes doses).

PENSEZ EGALEMENT A RENOUVELER LA PROTECTION ANTI-LIMACES.

#### Altises

Les captures en cuvettes sont rares. On observe quelques piqûres sur feuilles, mais le seuil d'intervention (de 30% de pieds touchés) est rarement atteint.

### CEREALES

#### Info produit

REAL (ou concept 727) de la société PEPRO, à base d'anthraquinone 84 g/l + triticonazole 200 g/l.

Ce produit est autorisé sur blé contre :

- \* Fusariose (f. roseum)
- \* Carie
- \* Charbon nu
- \* Oïdium
- \* Septorioses
- \* Rouilles brune et jaune.

Il s'emploie à la dose de 0.6 l/quintal (soit 120 g de triticonazole par quintal) pour une densité de semis visant 300 grains/m<sup>2</sup>. Coût approximatif du traitement : 300 F par hectare.

#### RESULTATS DU REAL DANS NOS ESSAIS CONDUITS EN 92 ET 93

Ce produit présente une rémanence supérieure aux traitements de semence classiques pour la septoriose et la rouille brune :

- \* Septoriose : efficacité jusqu'au stade 2 noeuds.
- \* Rouille brune : efficacité jusqu'à l'épiaison.
- \* En revanche, pour l'Oïdium, la rémanence ne dépasse pas le stade épi 3 cm.

### Cicadelles

#### (psammotettix alienus)

Cet insecte, vecteur du virus responsable des pieds chétifs, est encore peu piégé à la tour à succion de Versailles.

Un réseau de piégeage suivi par notre Service dans le sud de la région, nous permettra de vous tenir informés des captures.

Dans l'immédiat, il est encore trop tôt pour présager du risque automnal, qui dépendra en grande partie des conditions météorologiques.

